

Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tannacomp®

500 mg / 50 mg tabletki powlekane

Substancje czynne: taniny białczan / etakrydyny mleczan jednowodny

Do stosowania u dzieci w wieku powyżej 5 lat, młodzieży i dorosłych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Tannacomp® i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tannacomp®
3. Jak przyjmować lek Tannacomp®
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Tannacomp®
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tannacomp® i w jakim celu się go stosuje

Tannacomp® jest lekiem na żołądek i jelita/lekiem przeciwbiegunkowym.

Wskazania do stosowania

- Leczenie ostrych nieswoistych biegunk
- Zapobieganie i leczenie biegunk podróźnych

Wskazówka:

W przypadku biegunk o ciężkim przebiegu, zwłaszcza z towarzyszącą gorączką i/lub krwawymi stolcami, należy zasięgnąć pomocy lekarza, ponieważ konieczne może być swoiste leczenie.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tannacomp®

Kiedy nie przyjmować leku Tannacomp®

jeśli pacjent ma uczulenie na taniny białczan (zawiera białko kurze), etakrydyny mleczan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tannacomp® należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Tannacomp® a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych/stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/stosować.

Nie należy stosować preparatów zawierających żelazo jednocześnie z lekiem Tannacomp®, lecz w odstępie kilku godzin, ponieważ w przeciwnym razie może być zmniejszone działanie preparatu żelaza.

Przyjmowanie leku Tannacomp® z jedzeniem i pićm

Działanie leku Tannacomp® jest wspomagane dietą. Oprócz już wymienionego zapewnienia dostarczania wystarczającej ilości płynów, należy unikać zwłaszcza pożywienia bogatoresztkowego i mocno przyprawionego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach, i w okresie karmienia piersią lek Tannacomp® należy przyjmować tylko na wyraźne zalecenie lekarza.

3. Jak przyjmować lek Tannacomp®

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka i częstość przyjmowania zależą od stopnia ciężkości biegunki.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dzieci w wieku 5-14 lat:	1 tabletkę powlekana 3-4 razy na dobę
Dorośli:	1-2 tabletki powlekane 4 razy na dobę
Dorośli profilaktycznie:	1 tabletkę powlekana 2 razy na dobę

Tabletki powlekane należy przyjmować przed lub w czasie posiłków z wystarczającą ilością płynu. W razie potrzeby można pokruszyć tabletki powlekane i wymieszać z jedzeniem lub pićm.

U dzieci i osób w podeszłym wieku biegunki, zwłaszcza w połączeniu z wymiotami, mogą w bardzo krótkim czasie spowodować niebezpieczną utratę wody i elektrolitów. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na wystarczające uzupełnianie wody i elektrolitów.

Lek Tannacomp® należy przyjmować regularnie aż do ustąpienia biegunki.

Leku Tannacomp® nie należy przyjmować przez czas dłuższy niż 3-4 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tannacomp®

Lek Tannacomp® nie prowadzi do zapań, nawet po przedawkowaniu. Dotychczas nie są znane żadne ciężkie zaburzenia zdrowotne jako następstwo przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku Tannacomp®

Nie należy stosować podwójnej ilości w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Tannacomp®

W takim przypadku dolegliwości mogą wystąpić ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

etakrydyny mleczan jednowodny 50 mg

Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna (Ph. Eur.), skrobi glikolan sodu (typ A) (Ph. Eur.), krzemionka koloidalna bezwodna, talk (Ph. Eur.), magnezu stearynian [roślinny] (Ph. Eur.), alkohol poliwinylowy, makrokol 3350, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty x H₂O, żelaza tlenek czerwony

Jak wygląda lek Tannacomp® i co zawiera opakowanie

Pomarańczowo-brązowa, podłużna tabletki powlekana z linią podziału po obu stronach.

Opakowania oryginalne zawierające 20 tabletek powlekanych i 50 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Telefon: +49 2371/937-0, Telefaks: +49 2371/937-106, www.medice.de, e-mail: info@medice.de

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015